DIRECTIONS: When used as directed, PRO® Aerosol Insecticide controls flies, mosquitoes, wasps, silverfish, cockroaches, fleas, ants, spiders, crickets, bedbugs, gnats, adult moths and accessible stages of stored product insects.

FLIES, MOSQUITOES, WASPS AND GNATS: Close doors and windows, Direct mist upwards to all parts of the room, especially windows and other light sources. Apply for 3 to 5 seconds for every 30 cubic metres of space. Keep room closed for 15 minutes after each treatment. Also direct mist into areas where insects are found.

CRAWLING INSECTS: To control ants, cockroaches, crickets, silverfish and spiders, spray hiding places such as baseboards, moist areas, openings around sinks, drains and pipes, behind cabinets and storage areas. Spray ant trails around door sills, window frames or in ant nests. Insects must be contacted to be killed. Spray directly on insects and where insects are present. Ensure proper ventilation after sealed areas have been treated and clean up dead insects.

TO CONTROL FLYING MOTHS: Treat all enclosures, arranging clothing and other articles so that the mist can circulate freely. Apply for 3 seconds per 30 cubic metres of space. Close treated areas for at least 45 minutes.

TO CONTROL BED BUGS: Spray mattress lightly, particularly around seams and tufts. Take beds apart and spray the frames, springs and all joints. Also spray cracks, crevices, baseboards and other possible hiding places around the room. Repeat as required.

TO CONTROL FLEAS: Spray infested areas such as pet's bed and resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, window and door frames and localized areas of floor and floor covering where these pests may be present. Remove old bedding and replace with fresh clean bedding after treatment, Insects must be contacted to be killed, DO NOT TREAT ANIMALS WITH THIS PRODUCT

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of spray. Wash after use. Cover fish bowls and remove pets for one hour when spraying rooms. Remove or cover all exposed foods and cooking utensils before spraying. This dispenser contains a liquid under pressure. Do not puncture or incinerate, or expose the container to temperatures higher than 50 degrees Celsius. Do not spray near open flame or spark or while smoking. Do not spray closer than 1 metre to fabric. Exceeding dosage rates and bi-weekly applications may cause stains on fabrics, furs and

FIRST AID: If on skin or clothing, take off contaminated clothing, Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If in eves, hold eve open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

## TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Treatment for the various reactions is symptomatic.

DISPOSAL: When container is empty. press valve to release all remaining pressure. Dispose of empty container in household garbage.

PRO® Agrium Inc. / Lic. Premier Tech Brighton Ltd.





## **AEROSOL** INSECTICIDE **INSECTICIDE EN AEROSOL**

PRESSURIZED PRODUCT: A PROFESSIONAL STRENGTH INSECTICIDE FOR USE AS HOUSEHOLD PEST CONTROL FOR FLIES, MOSQUITOES, WASPS, SILVERFISH, COCKROACHES, FLEAS, ANTS, SPIDERS, CRICKETS, BEDBUGS, GNATS, ADULT MOTHS AND ACCESSIBLE STAGES OF STORED PRODUCT INSECTS.

PRODUIT SOUS PRESSION: INSECTICIDE PROFESSIONNEL CONTRE LES NUISIBLES DE LA MAISON: MOUCHES, MOUSTIQUES, GUÊPES, LÉPISMES, BLATTES, PUCES, FOURMIS, ARAIGNÉES, GRILLONS, PUNAISES, MOUCHERONS, PAPILLONS DE NUIT (STADE ADULTE) ET INSECTES DES PRODUITS STOCKÉS (STADES ACCESSIBLES).

## DOMESTIC / DOMESTIQUE

GUARANTEE:	Pyrethrins	0.5%
	Piperonyl Butoxide	
GARANTIE:	pyréthrines	0,5 %
	butoxyde de pipéronyle	4,0 %

REG. NO. 16282 P.C.P. ACT N° D'HOM.16282 LOI P.A.

READ THE LABEL BEFORE USING LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIER TECH BRIGHTON LTD. 1, avenue Premier Rivière-du-Loup QC G5R 6C1 1-844-475-1262









PROFESSIONAL / PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI: Lorsqu'il est utilisé selon les instructions, l'insecticide en aérosol PRO® contrôle les mouches, maringouins, quêpes, lépismes, blattes, puces, fourmis, araignées. grillons, punaises des lits, moucherons, mites adultes et les stades accessibles d'insectes de produits entreposés

MOUCHES, MARINGOUINS, GUÊPES ET MOUCHERONS: Fermer les portes et fenêtres. Diriger la buée vers le haut dans toutes les parties de la pièce, spécialement vers les fenêtres et autres sources d'éclairage. Appliquer pendant 3 à 5 secondes pour chaque 30 mètres cubes d'espace. Garder la pièce fermée pendant 15 minutes après chaque traitement. Diriger aussi la buée vers les endroits où se trouvent des insectes.

INSECTES RAMPANTS: Pour contrôler les fourmis, blattes, grillons, lépismes et araignées. pulvériser les endroits où ils peuvent se cacher tels que les plinthes, endroits humides, ouvertures autour des éviers, drains et tuyaux, derrière les cabinets et dans les aires d'entreposage. Pulvériser les traces de fourmis autour des seuils de portes, encadrements de fenêtres ou dans les nids de fourmis. Les insectes doivent être contactés par l'insecticide pour être détruits. Pulvériser directement sur les insectes et aux endroits où il v a des insectes. Assurer une ventilation appropriée des endroits scellés après le traitement et le nettoyage des insectes détruits.

POUR CONTRÔLER LES MITES VOLANTES: Traiter toutes les enceintes en arrangeant les vêtements et autres articles de facon à ce que la buée puisse circuler librement. Appliquer pendant 3 secondes par 30 mètres cubes d'espace. Garder les endroits traités fermés pendant au moins 45 minutes.

POUR CONTRÔLER LES PUNAISES DE LITS: Pulvériser légèrement les matelas. particulièrement autour des coutures et du capitonnage. Défaire les lits et pulvériser les montures, ressorts et tous les joints. Pulvériser aussi les fentes, crevasses, plinthes et autres endroits où elles peuvent se cacher autour de la pièce. Répéter tel que requis.

POUR CONTRÔLER LES PUCES : Pulvériser les endroits infestés tels que les lits et endroits où se couchent les animaux domestiques, les fentes et crevasses près de ces endroits, le long et derrière les plinthes, les seuils de portes et encadrements de fenêtres et les surfaces localisées et recouvrements de plancher où ces insectes peuvent être présents. Enlever les vieilles litières et les remplacer par des litières fraîches et propres après le traitement. Les insectes doivent être contactés par l'insecticide pour être détruits. NE PAS TRAITER LES ANIMAUX AVEC CE PRODUIT.

PRÉCAUTIONS: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec la peau, les veux et les vêtements. Ne pas aspirer le jet pulvérisé. Se laver après utilisation. Couvrir les bols à poissons et sortir les animaux domestiques des pièces pulvérisées. pendant une heure. Sortir ou couvrir tous les aliments et ustensiles de cuisson exposés avant de pulvériser. Ce distributeur contient un liquide sous pression. Ne pas percer ou jeter au feu ou exposer ce contenant à des températures au-delà de 50 degrés Celsius. Ne pas pulvériser près de la flamme nue ou des étincelles ou pendant qu'on fume. Pulvériser à au moins 1 mètre des tissus. Un dosage excessif et des applications à toutes les deux semaines peuvent tacher les tissus, les fourrures et d'autres matières.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les veux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne co empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir recu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter les différentes réactions d'après les symptômes. ELIMINATION: Lorsque le contenant est vide, presser sur la soupape pour dégager la

e pression qui reste dans le contenant. Jeter le contenant vide dans les déchets domestiques.

